

الفطام هو مرحلة و ليس لحظة فكيف تتعاملين معها؟



وقد يكون النظام تدريجياً حيث يتم استبدال الرضاعة الطبيعية بالطعام وجبة واحدة أسبوعياً حتى يتم الوصول تدريجياً إلى الاستبدال الكلى للرضاعة الطبيعية والاستغناء عنها بوجبات طعام صلب، أو نظام جرئي حيث تتم الرضاعة مرة أو اثنين فقط في أثناء اليوم واستبداله بالطعام الخارجي.

تكثر التعاريف العلمية للفطام ولكن النتيجة واحدة والهدف واحد وفي كل الاحوال قد يحدث بشكل طبيعي.. وبشكل تعريف مبسط فالفطام هو المرحلة التي يبدأ فيها الطفل الاعتماد على مصادر أخرى للتغذية بدلاً من الاعتماد الكلي على الرضاعة الطبيعية. ويجب التأكيد أن الفطام عملية تدريجية تحتاج للصبر والفهم

لا يقصد بالفطام الامتناع الكلى عن الرضاعة الطبيعية فقط كما هو مفهوم عند الكثير. فكلمة الفطام يقصد بها اكثر من معنى. و أي من التغيرات الآتية يطلق عليها فطام: التحويل من الرضاعة الطبيعية إلى الرضاعة الصطناعية.. التحويل من الرضاعة الطبيعية او الصطناعية إلى الطعام غير الصلب.. التحويل من الرضاعة الطبيعية او الصطناعية إلى الطعام الصلب.

و معلوماتك ايتها الام ان الفطام يكون اكثر سهولة إذا كان الطفل يأخذ حليباً صناعياً بجانب حليبك. لذلك يجد البعض فكرة جيدة أن تبدأ الأم بإعطاء الطفل حليب الثدي بعد قدرتها على الرضاعة. و تكون هذه الطريقة مناسبة إذا كان الطفل تتم خياطته لـ 3-4 مرات أو أكثر يومياً.

الفطام فيما بعد.

يفضل البدء بعصير الفواكه الطازجة و البدء بملعقة واحدة الى عشر ملاعق تدريجياً شيئاً فشيئاً.. كل فترة تزيد ملعقة.. و يجب أن تبدأ بتنوع واحد فقط من الفاكهة و زيادة كميته تدريجياً كل يوم ووضعها بفمه من دون خوف...اما اذا وضعت الطعام الصلب على فمه و رفضه فيعني هذا ان الوقت لم يحن بعد وكي تكون فترة الفطام إمساك للطفل... بعد الفاكهة يتبع إدخال الخضروات المهرولة ثم سهلة اتباع النصائح الآتية:

إشعال الطفل بطبع مسلية

تغيير المكان المعتاد للطفل للرضاعة.

إذا كان الطفل اقل من عام يبدأ بتعويذه على إعطاء الحليب في تجاهه أو جهة

و المشرف للأم هو تحديد الوقت

وَهُمْ لِي أَنْتَ مُوَلِّي وَأَنْتَ مُوَلِّي

استشارات طبية

سـ / هل يمكن للحامل ترشير البشرة؟

جـ / نعم يمكن ذلك لأن بشرة الحامل تحتاج إلى الكثير من العناية حتى تكون قادرة على مواجهة التعدد مع تقدم شهر الحمل ، ولكن عملية الترشير ملحة أو مرتين في الأسبوع تساعد على التخلص من الخلايا الميتة ومن ثم تنشيط عملية تجدد الخلايا .

سـ / لماذا تناصح الحامل بعدم تناول فيتامين E خلال الحمل؟

جـ / لأن زيادة تناول هذا الفيتامين قد تؤدي إلى الإصابة بتشوهات الجنين وخصوصاً إذا كانت المرأة قبل الحمل تتناول حبوب منع الحمل أو الحبوب الخاصة بمعالجة حب الشباب والتجاعيد .

سـ / كيف تتجنب الحامل تساقط الشعر؟

جـ / يمكن للحامل تجنب تساقط شعرها عن طريق استعمال الزيوت التي تدخل في تركيبتها مكونات الليمون أو البابونج ويجب أن تكون هذه الزيوت ذات نوعية جيدة ومخففة بالماء .

تجنب عنها الدكتورة هديل طبيبة نسائية
ورعاية حوامل :
بغداد / المدى

مسن / لما يصاب جسم المرأة الحامل بasmrar اللون .

جج / ان اسباب زيادة اسمرار جسم المرأة الحامل والذى قد يتتركز في اماكن معينة من الجسم بسبب اختلاف الخلايا الصبغية التي تكون قابلة للتفتك والهرمونات في حالة زيادة لهذا اذا تعرض جسم المرأة الحامل الى اشعة الشمس لوقت طويل تظهر تلك البقع السمر .

مسن / لاذ لاتنصح الحامل باستخدام السونا او الحمام

الحار؟

جج / لاتنصح المرأة الحامل باستخدام حمام ساخن لاسباب اعديدة اهمها لان الماء الحار يزيد من مشاكل الدورة الدموية التي تكثر اصلاحا خلال الحمل وتساهم في ظهور الدوالى كما ان ارتفاع المفاجى لحرارة الجسم يزيد من سرعة خفقان القلب ومن ثم تشعر الحامل بتوعك وضيق في التنفس

المربي يحارب السرطان



براز المريض او التقيؤ وما قد يؤدي الى حدوث هبوط في الضغط الدموي ويتزامن مع حدوث الاغماء بل فقدان الوعي في بعض الحالات.

٢- تضيق مجرى الطعام : قد يؤدي نشوء القرحة الى تضيق مجرى الطعام من المعدة وتكون النتيجة تراكم العصارات المعدية والاطعمه غير المهضومة فتؤدي الى تقيؤ المريض واصابته بفقدان السوائل في الجسم والجفاف والعسر الهضمى ..

الوقاية من القرحة

ويشير الدكتور محمد على الى انه يمكن تلخيص اساليب الوقاية من القرحة في الابتعاد عن العوامل التي تساعده على نشوئها مثل :

١- الامتناع عن التدخين وشرب الكحول

٢- الامتناع عن تناول اقراسن الاسبرين ومشتقاته للمصابين بالقرحة ..

٣- تناول وجبات صغيرة من الاطعمه سهلة الهضم كالطعم المسلط والخضروات والفاكهه الطازجه والابتعاد عن الاطعمه المقليه ، وتناول الدهون والحلويات الدسمه والقهوة والشاي واتباع نظام غذائي معتمد ليس فيه تفريط ، وعدم الاكل مبالغة بعد تناول الطعام وتناول الاكل في حالات الانفعالات النفسيه لأن ذلك يؤدي الى اضطرابات وسوء الهضم.

ويختتم الدكتور محمد على حديثه بالقول :

-يعتمد علاج قرحة المعدة بالدرجة الاولى على مدى تقييد المريض بالعلاج الدوائي واتباع اساليب الوقاية التي منها تجنب التدخين والكحول والاطعمه المقليه ، وقد تمتد فترة العلاج الى ٣ اشهر . وهناك احتمالات لعودة القرحة في معظم الحالات.

خطوات التشخيص في اجراء فحصين رئيسين هما ، اشعة البايبوم ومنظار الجهاز الهضمي العلوي .

١- اشعة الباريوم : يقوم المريض بشرب كمية معينة من سائل الباريوم الذي يقوق بتغلييف البطانة المخاطية للمرئ والمعدة والاثني عشر وبما ان الاشعة السينية لا تتمكن من اختراق طبقة الباريوم فانها تظهر بيهاء اللون مع خلفية سوداء على الفيلم الاشعاعي فإذا كانت هناك قرحة فان مادة الباريوم تمثل هذه الفجوة فتؤدي الى نتوء في الشكل الاملس المعهود للمعدة والاثني عشر وتعتبر هذه الوسيلة امنة ودقيقة للتتشخيص .. لكنها لا تعطى معلومات كافية مما يزيد لجوء الاطباء الى وسيلة اخرى تسمى بالمنظير الباطني (منظار الجهاز الهضمي العلوي) ..


٢- منظار الجهاز الهضمي العلوي : يتم اجراء هذه الطريقة عن طريق تمرير انبوبة طويلة مرنة تحتوي في نهايتها على مصدر للضوء وعدسةكاميرا (منظار) عبر الفم الى المريء والى المعدة ومنها الى الاثني عشر ويستطيع الطبيب فحص الغشاء المخاطي للجهاز الهضمي فحصا مباشرا ودققا بناء على ما يلاحظه من التغيرات في الغشاء المخاطي للمعدة فإذا ما وجد الطبيب قرحة يقوم بوساطة الانبوب باخذ عينات صغيرة من النسيج الحي من اجل فحصها تحت المجهر للتأكد من عدم وجود سرطان او اورام خبيثة اما مضاعفات القرحة فهي :

١- النزف : يعتبر النزف احد اسوأ المضاعفات المنتشرة عند المصابين ويتم ذلك نتيجة حدوث جرح لاحده الاروعية الدموية الملائقة لجدران المعدة وقد يكون النزف ثانويا وتدريجيا فيؤدي الى فقر الدم ، او نزفا رئيسيا فيحدث نزف ملحوظ في

Causes of Ulcers:

- التدخين** : ينبع عن نسبة اصابة غير المدخنين ، ويتم تفسير ذلك من الناحية العلمية بالقول ان ماد التبغ موجودة في السجائر هو السبب ..
- الاغذية** : ومن الاغذية الحار الغنية باليتوابل والتي منها الفلفل الحار والشطة ، وينصح مرضى القرحة بتجنب كل ما قد يؤدي الى تفاقم الاعراض ..
- الادوية** : بعض الادوية مثل الاسبرين ومشتقاته وكثير من المسكنات المضادة تساعد على نشوء القرحة وخصوصا عند المرضى المصابين بداء الروماتيزم الذين يحتاجون الى كميات كبيرة من هذه المسكنات .
- جرثومة الهليكوباكتربيلوري** وهي كائن مجهرى يدخل الجسم عن طريق الفم بوساطة تناول اطعمة غير نظيفة مثل الخضر او اكل الفواكه والسلطات .
- العوامل النفسية** : تعمل التوترات النفسية والضغط العصبي على زيادة افراز المواد الكيسيابوي التي الموجودة في الجسم والتى تؤدى الى تفاقم القرحة عن طريق زيادة الافرازات الحامضية في الجها
- العوامل الوراثية** : تلعب العوامل الوراثية دورا كبيرا في نشوء القرحة . وثبتت الدراسات ان نسبة الاصابات بقرحة الاثني عشر والقرحة تزداد بمقدار ثلاثة اضعاف في اشخاص العائلة الواحدة في حالة اصابة احدهم بها مقارنة بالعائلات الاخرى . غير المصابة .
- تشخيص القرحة** ويفيد الدكتور محمد علي ارشاد التشخيص الصحيح في غالبية الاصابات نظر الشاب اعراضها مع اعراض امراض مختلفة اخرى . وتتمثل

تدرك القرحة .. قبل ان تستفحل



بغداد - سها الشيخلي

أسباب ستة .. نؤدي الى الاصابة بمرض القرحة التي يشخصها الاطفال بفحصينهما. اشعة الباراكسيلا ومتضليل الجهاز الهضمي الغلوكول ولكن لهذا المرض الذي يظهر بشدة في الجدار الداخلي للمعده والاثني عشر طرقاً للوقاية .. لتجنب العملية الجراحية ..

أسباب القرحة

ثلاثي الدكتور ابراهيم محمد اخصاصي امراض (الباطنية) قسم الجهاز الهضمي في مستشفى مدينة الطب الذي يشار الى ان اسباب عديدة لحدوث القرحة والتي هي عبارة عن جرح في الجهاز الداخلي للمعده، وغالباً ما يكون بشكل فوهة صغيرة دائيرية او بيضوية .. وتتجدد

الحصبة الألمانية تبدأ كالزكام

النكافية التي قد يكون من مضاعفات الإصابة بها ضعف الإنجذاب عند الذكور إذا حدث التهاب بالخصيتين حيث يؤدي إلى حدوث عقم مؤقت بنسبة ١٢٪ من الحالات المصابة، لكن العقم المطلق احتمالية نادرة. ويجب أن يعطى المصل كالأتي جرعة عند سن ١٢ - ١٥ شهرًا. (٢) جرعة عند سن (٤ - ٦ سنوات) أو (١١ - ١٢ سنة). (٣) بعد البلوغ: يعطى للسيدات غير الحوامل مع مراعاة تأجيل الحمل لمدة شهرين بعد التطعيم كإجراء وقائي لحماية الجنين.

× العلاج: طريقة علاج الحصبة الألمانية لا تقل من فتره الإصابة بالمرض أما بالنسبة للجنين، فلا يوجد علاج للحد من مضاعفات الحصبة فلعلاج الجنين المصاب بالمرض في رحم الأم يعتمد على مدى حالة الجنين بعد التععرض للمرض، إذا حدثت إصابة فعلية بالحصبة الألمانية عند الطفل أو الشخص البالغ فيجب إتباع الآتي: (١) الراحة التامة في الفراش (حسب إرشادات الطبيب). (٢) التناول من إجراء فحوص طبية على الأشخاص الذين يتعاملون مع الطفل بشكل يومي (حسب إرشادات الطبيب). (٣) يصف الطبيب بعض العقاقير لخفض الحرارة أو تخفيض المفاصل.

الأحوال عن ٤٣٨ م □ تضخم وضعف في العقدة الليمفاوية في قاعدة الجمجمة وخلف الأذن، ويبداً تضخم الغدد الليمفاوية قبل الطفح الجلدي بيوم واحد وهو من العلامات المميزة لهذا المرض × يقع حمر بسيطة تظهر على الوجه، الجسم ثم الأذرع والساقي × ألم في المفاصل × لا يستمر ارتفاع الحرارة ولا الطفح الجلدي أكثر من ثلاثة أيام، حيث ينتشر الطفح من الوجه إلى باقي الجسم ويختفي بسرعة خلال تلك الفترة، لذلك يسمى هذا المرض أحياناً «حصبة الأيام الثلاثة»، أما تضخم الغدد فقد يستمر لمدة من ٧ - ١٠ أيام.

الوقاية والعلاج:

«الوقاية» تكون الوقاية بأخذ المصل الخاص بالحصبة الألمانية ويوجد هذا المصل منفرداً (مصل ضد الحصبة الألمانية فقط) أو متعددًا مع مصل الحصبة المعتادة والتهاب الغدة النكافية وهذا الطعام يعرف بـ (MMR) ويُسمى ثلاثي الحصبة، وفي الحقيقة فإن هذا المصل المشترك في غاية الأهمية لعملية الإنجذاب، وذلك للوقاية من الحصبة الألمانية بمخاطرها التي عرفناها وكذلك الوقاية من الحصبة المعتادة التي قد تؤدي إلى إصابة المرأة بها في أثناء الحمل إلى موت الجنين وكذلك الوقاية من التهابات الغدة المفاصل.

تنقل الحصبة ووساطة الرذاذ على فيروسات بـ إلى الشخص مزارات الجهاز مخاطر الأنف يهدى عن ارتفاع خفيف بأي حال من

في النصف الاول من هذا العام قامت وزارة الصحة العراقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف بحملات تلقيح ضد الحصبة في المناطق التي شهدت احداثاً ساخنة ولم تصل اليها اللقاحات خلال تلك الفترة وخصوصاً محافظة الانبار.. وتم بخراج تلقيح اكثر من ٢٠٠ الف طفل دون سن الخامسة وقاية لهم من خطر الاصابة بمرض الحصبة... خطورة هذا المرض واعراضه وعلاجه ستنتعرف عليه الان ... كي يدرك القارئ مدى خطورته على اطفالنا...
الحصبة الالمانية هي مرض معد يسببه فيروس الحميرة ولا يسبب للطفل إزعاجاً أكثر من إزعاج الزكام، وتستمر فترة حضانة الفيروس بعد أن يدخل الجسم من ١٤ إلى ٢١ يوماً وعادة يكون ١٨ يوماً ثم تبدأ أعراض المرض في الظهور مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم خلال اليومين الأولين وقد تنتفخ الغدد الواقعة خلف الأذنين وحول العنق وبظهر الطفح في اليوم الأول أو الثاني ويتكون من بقع مسطحة حمر قانية في منطقة الوجه، ثم ينتشر بسرعة إلى جميع أنحاء الجسم وتنزول كل الأعراض في اليوم الرابع والخامس. ويكون المصاب معدياً في الفترة من أسبوع قبل ظهور الطفح إلى مدة أربع أيام بعد

لماذا لا يشعر المرأة برائحة فمه الكريهة؟



يتسائل بعضهم عن أسباب عدم شعور المرء بتأثير رائحة فمك الكريهة على الآخرين، فأكالوا الشوم مثلاً لا يلتقطون غالباً إلى رائحة فمهم التي تؤثر فيهم حولهم.

يطلق أطباء الأنف والأذن والحنجرة على هذه الظاهرة «التناقل» لأن الفم والأنف مرتبطان بعضهما ومن ثم تند هذه الرائحة بشكل رتيب فيعتادها الشخص ولا يلتقط إلى أنواعها فيما بعد.

تتصدر هذه الظاهرة أكثر إذا ضربنا مثلاً لشخص قادم من الهواء الطلق إلى حجرة مكتملة، سيجد هذا الشخص أن رائحة المكان كريهة في حين أن الجالسين في الحجرة لوقت طويلاً لا يلاحظون ذلك (لأنهم اعتادوها).

من ذلك نفهم لماذا يشم المحظيون رائحة فم شخص في حين أن الشخص نفسه لا يشمها.

ويقول دكتور ميشائيل ديج من اتحاد أطباء الأنف والأذن إن أسباب انتشار الروائح الكريهة من الفم عديدة بينها الأسنان التالفة أو إصابة تجويف الفم بمرض، إضافة إلى تناول بعض المأكولات مثل الشوكولاتة والبيتزا. كذلك فإن الإحمرار والتدخين يزيدان من كرامة رائحة الفم.

وتتشكل الرائحة من الناحية الكيميائية عن طريق البكتيريا وبقايا الطعام وبعض المواد العضوية الأخرى التي تؤدي إلى نشوء نوع من الروابط الكبريتية التي تخرج مع الزفير.

ولا يفلح غسيل الأسنان بالفرشاة أو مضغ اللبان أو أفراس النعناع في التخلص على الرائحة الكريهة إلا لمدة قصيرة.